

必胃康[®]腸溶膜衣錠 20 毫克
Controloc[®] Control Gastro-Resistant
Tablets 20mg

醫師藥劑生指示藥品
衛署藥輸字第 022962 號

【有效成分及含量】每顆腸溶錠含有 20 mg 的 pantoprazole (as sodium sesquihydrate)。

其他成分(賦形劑): Mannitol, Sodium carbonate, Crospovidone, Povidone K 90, Calcium stearate, Hypromellose, Povidone K 25, Titanium dioxide (E171), Yellow ferric oxide (E172), Propylene glycol, Eudragit L30 D-55 consisting of : Methacrylic acid-ethyl acrylate copolymer (1: 1), Sodium laurilsulfate, Polysorbate 80, Triethyl citrate, Printing ink brown consisting of : Shellac, Red ferric oxide(E172), Black ferric oxide(E172), Yellow ferric oxide E172, Ammonia solution (concentrate).

【用途(適應症)】短期緩解心窩灼熱、噯酸水等症狀。

【效能】Pantoprazole 可專一性阻斷胃部壁細胞的氫離子幫浦，直接抑制胃酸分泌。大多數使用者在 1 週內，心窩灼熱及胃酸逆流症狀可完全消除。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用:

- (1). 未滿 18 歲。
- (2). 對 pantoprazole 或本藥其他成分過敏。(詳見其他成分)
- (3). 正在服用含有 atazanavir 的藥物(治療 HIV 感染用藥)。

二、有下列情形者，請洽醫師診治:

- (1). 55 歲以上，且新發生胃食道逆流，或是最近的胃食道逆流症狀發生改變。
- (2). 曾有過胃潰瘍或接受胃部手術。
- (3). 有肝臟問題或黃疸(皮膚或眼睛發黃)。
- (4). 因為嚴重的問題或狀況而須定期就醫。
- (5). 曾經治療心灼熱或消化不良連續 4 周或 4 周以上。
- (6). 最近預計進行內視鏡檢查或幽門桿菌吹氣檢查(C-尿素檢查)。
- (7). 未刻意減重但體重下降。
- (8). 嘔吐，尤其有反覆發生的情形。
- (9). 吐血，出現類似深色咖啡渣的嘔吐物。
- (10). 糞便中有血:糞便外觀可能呈現黑色或瀝青狀。
- (11). 吞嚥困難或吞嚥時感到疼痛。
- (12). 臉色蒼白，感覺虛弱(貧血)。
- (13). 胸痛。
- (14). 胃痛。
- (15). 嚴重或持續腹瀉。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生:

- (1). 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- (2). 55 歲以上，且每天服用消化不良的成藥。
- (3). 正在使用、最近曾經使用，或可能使用其他任何藥品，請告知醫師或藥師。
本藥可能會讓其他某些藥品無法正常作用。尤其含有以下有效成分的藥品:
-ketoconazole(用途為治療黴菌感染)。
-warfarin 與 phenprocoumon (用途為避免血液凝固、預防血栓):可能需要進行進一步的血液檢查。
-methotrexate (用途為治療類風濕性關節炎、乾癬與癌症)。
-其他降低胃酸量的藥物，例如其他氫離子幫浦抑制劑(omeprazole、lansoprazole、rabeprazole)或 H2 拮抗劑(如 ranitidine、famotidine)。但有需要時可以併用制酸劑(如 magaldrate、alginic acid、碳酸氫鈉、氫氧化鋁、碳酸鎂，或以上成分之複方)。

四、其他使用上注意事項:

- (1). 為防止兒童誤食，請妥善保管。
- (2). 避免陽光直射。
- (3). 如果您安排要進行血液檢驗，請告知醫師您正服用本藥。
- (4). 服用本藥後，雖然可能只要一天就能緩解胃酸逆流與心灼熱的症狀，但本藥的用途並非立即的症狀緩解。
- (5). 請勿服用本藥作為預防性使用。如反覆發生心灼熱或連續一段時間消化不良，請定期回診就醫。
- (6). 請勿開車或操作危險性機械，可能發生暈眩或視覺異常等副作用。
- (7). 請勿超過建議劑量，如果忘記服用本藥，請勿補服兩倍的劑量。

【良好生活習慣也有助於緩解心窩灼熱或胃食道逆流相關症狀】

1. 避免暴飲暴食。
2. 慢慢進食。
3. 戒菸。
4. 減少酒精與咖啡因的攝取。
5. 減重(如果體重過重)。
6. 避免過緊的衣物或皮帶。
7. 睡前3小時不要進食。
8. 抬高床頭(如果夜間出現症狀)。
9. 減少食用會造成心窩灼熱的食物，例如：巧克力；胡椒、薄荷、高脂與油炸的食物、酸性食物、辛辣食物、柑橘類水果與果汁、番茄。

【用法用量】

年齡	用法用量	注意事項
18歲以上	每日一錠。 每天固定同一時間飯前服用。	1. 不要咀嚼或弄碎藥錠，整顆藥錠配水吞服。 2. 可連續服用2-3天直到症狀改善，一旦症狀完全緩解，應停用本藥。
未滿18歲	不建議使用。	

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下輕微短暫性副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

發生頻率	身體部位	副作用
不常見(可能每100人發生1例)	精神、神經系統	頭痛；暈眩；感覺虛弱、疲累或全身不適；睡眠障礙
	腸胃系統	腹瀉；噁心、嘔吐；腹脹、腸胃脹氣；便秘；口乾；腹痛、腹部不適
	皮膚	皮疹或蕁麻疹；搔癢
	血液檢驗	肝臟酵素升高
罕見	味覺	味覺變化或完全喪失味覺
	眼睛	視力模糊
	精神方面	憂鬱
	血液檢驗	膽紅素與脂肪濃度升高、血液中的顆粒白血球急速減少
其他	關節疼痛；肌肉疼痛；四肢腫脹；高燒；男性胸部脹大；體重改變；體溫升高	
極罕見(可能每10000人發生1例)	神經系統	失去方向感
	血液系統	有出血情形或比平常容易淤血、容易得到感染性疾病
	血液檢驗	血小板數量降低；白血球數量降低；紅血球、白血球與血小板的數量同時異常降低。
未知	精神方面	幻覺、意識混亂(特別是曾有此症狀的患者)
	血液檢驗	鈉、鎂濃度降低

二、服用本藥後，若有發生以下罕見但較嚴重症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

嚴重過敏反應 (罕見：可能每1000人發生1例)	臉部、嘴唇、嘴巴、舌頭或喉嚨腫脹，吞嚥或呼吸困難；蕁麻疹、嚴重暈眩、心跳極快；盜汗。
嚴重皮膚反應(發生率未知)	出疹且腫脹、起水泡或皮膚剝落；眼睛周圍、鼻子、嘴巴、生殖器官脫皮與出血；整體健康急速惡化；曬太陽後出疹。
其他嚴重反應(發生率未知)	皮膚與眼睛發黃；如排尿疼痛、下背痛且發燒。

【包裝】 每盒 7 錠

【保存方式】 30°C 以下

製造廠：Takeda GMBH, production site Oranienburg

廠址：Lehnitzstrasse 70-98, 16515 Oranienburg, Germany

藥商：台灣武田藥品工業股份有限公司

地址：台北市信義區松高路 1 號 17 樓

電話：0800 008999